



Rezepturausdruck

French Gel Builder White (G047)

CPNP 144 5909

Typ	Deklaration	Cas-Nr.	FDA
INCI	DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE	72869-86-4	A1
INCI	URETHANE ACRYLATES	n.b.	C
INCI	SILICA DIMETHYL SILYLATE	68611-44-9	E
INCI	TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	42978-66-5	E
INCI	METHYL BENZOYLFORMATE	15206-55-0	E
INCI	HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE	947-19-3	F
INCI	HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	27813-02-1	G
INCI	BHT	128-37-0	G
INCI	P-HYDROXYANISOLE	150-76-5	G
INCI	CI 77891	13463-67-7	G
INCI	CI 60725	81-48-1	G

FDA: A1 = 75–100 %; A2 = 50-75 %; B = 25-50%, C = 10-25%; D = 5-10%; E = 1-5%; F = 0,1-1%; G = 0-0,1%, H = Spuren

Produktbeschreibung:

Besonders standfestes French Gel ohne Verfärbungen, besonders geeignet zur Modellage der French-Spitze mit Schablonen.

Anwendungshinweis:

Das Builder White Gel wird am Nagelrand zur Verlängerung des natürlichen Nagels als French-Spitze auf der Nagelschablone aufgetragen und ausgehärtet.

Im Anschluss wird mit einem Modellage Gel Ihrer Wahl weiter gearbeitet.

Härtungszeit : UV/LED 90 Sek

French Gel Builder White

Kennzeichnungselemente:



Achtung

H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

EUH204 – Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P280 – Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk gemäß EN 374 und Augenschutz gemäß EN 166 tragen

P302 + P352 – BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P333 + P313 – Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 – Inhalt/Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

UN-Nummer 3082